

## INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA HEPÁTICA

Su cita es el: \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_.

Por favor, llegue para registrarse 45 minutos antes de la hora programada.

La biopsia hepática es una prueba en la que el médico utiliza una aguja para extraer un pequeño trozo de tejido del hígado. A continuación, el tejido se envía al laboratorio para evaluar el estado del hígado.

*Someterse a una biopsia hepática requiere una gran planificación y cooperación entre usted y el equipo médico. Nuestros requisitos están presentes para proporcionarle la atención más segura. Necesitaremos su mejor esfuerzo para acudir a todas las citas programadas. El calendario de pruebas en relación con la biopsia es importante. La reprogramación de citas supondrá un retraso en su tratamiento y puede hacer que tenga que repetir otras pruebas si han caducado. El seguro puede cubrir o no el costo de la repetición de las pruebas.*

Póngase en contacto con su Coordinador de Salud Digestiva e infórmele de cualquier prueba previa que se haya realizado fuera de UVA o si tiene alguna pregunta sobre su próximo procedimiento.

**Dentro de los 6 meses anteriores a su biopsia**, debe someterse a uno de los siguientes: Ecografía abdominal, resonancia magnética o tomografía computarizada. Esto se hace para comprobar si hay anomalías en el hígado antes de la biopsia. La programación de su biopsia no se puede hacer hasta que tengamos estos resultados.

**Dentro de las 12 semanas anteriores a su biopsia**, debe hacerse análisis de sangre que incluyan: CBC/Plt y PT/INR. Estos análisis ayudan a determinar si podría tener riesgo de hemorragia debido a su función hepática.

**En la semana anterior a su biopsia**, debe realizar los siguientes cambios en la medicación.

1. Deje de tomar antiinflamatorios no esteroideos como Aspirina, Ibuprofeno Advil®, Aleve®, Ecotrin®, Bufferin®, Nuprin® o Excedrin® durante 7 días antes de la biopsia.
2. Si toma medicamentos anticoagulantes como apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto), dabigatran (Pradaxa), Coumadin (Warfarin®), Ticagrelor (Brilinta) o clopidogrel (Plavix®), póngase en contacto con su médico y pregúntele si puede dejar de tomarlos 5-7 días antes de la biopsia. Si su médico le dice que no es seguro dejarlo, póngase en contacto con su Coordinador de Salud Digestiva.
3. Si es diabético, llame a su médico habitual para preguntarle si puede ajustar la dosis de su medicamento para el azúcar en sangre el día de la biopsia, ya que ese día no seguirá su dieta habitual.

### Día de su biopsia

1. Deberá contar con un conductor adulto responsable que le lleve a casa. El conductor debe estar con usted cuando se registre y permanecer con usted hasta que la enfermera hable con él. Por favor, informe al conductor de que tiene que estar disponible para nosotros durante y después de su procedimiento. Por su seguridad, UVA Health recomienda que esta persona permanezca con usted durante varias horas después de su procedimiento. No podrá conducir durante las **24 horas** siguientes a la intervención.
2. No coma alimentos sólidos ni beba productos lácteos durante las 7 horas previas a la biopsia. Sólo puede beber líquidos claros hasta 3 horas antes de la cita.
3. Tome sus medicamentos para la presión o el corazón el día de la biopsia. Lleve consigo una lista actualizada de sus medicamentos.
4. Por favor, deje todas las joyas y piercings en casa.
5. Usted no podrá levantar más de 10 libras durante 2 días después de la biopsia, haga planes para esto con su empleador si es necesario.

Gracias por elegir el Centro de Salud del Aparato Digestivo de la Universidad de Virginia.